

Qüestionari de detecció precoç: ERiraos-15

© K. Maurer, F. Hörrmann & H. Hafner.
Traducció al castellà de Jorge L. Tizón i Anna Oriol
EAPPP - 06/2006.

Presentació elaborada per Jordi Artigue per a les II Jornades de l'EAPPP realitzades al Novembre de 2008

Origen de l'inventari:

**EVALUACION
RETROSPECTIVA DEL
INICIO DE LA
ESQUIZOFRENIA.
(IRAOS)**

- L'IRAOS inclou apartats relatius a la biografia social, als recorreguts assistencials i a una llista de 65 símptomes elaborada de manera empírica. Posteriorment, aquest instrument va ser ampliat per abordar els símptomes dels trastorns d'ànim, facilitant així l'avaluació i la duració dels símptomes en el curs inicial del trastorn.
- Entrevista estructurada de 110 signes, classificats en 12 grups simptomàtics. Permet una valoració de la fase prodròmica prepsicòtica, dels aspectes afectius i de les dimensions esquizofrèniques així com de l'evolució o les modificacions al llarg del temps.

Origen de l'inventari:

EVALUACION RETROSPECTIVA DEL INICIO DE LA ESQUIZOFRENIA. (IRAOS)

- Autors: H.Häfner; A.Riecher-Rössler; B.Fätkenheuer; K.Maurer; S.Meissner; W.Löffler. Interview for the retrospective assessment of the onset and course of schizophrenia and other psychoses. Göttingen: Hogrefe & Huber, 2003.
- Traducció anglesa: G.Patton.
- Traducció al castellà de J.L.Tizón, F.Pareja i A.Álvarez; Unitat de Salut Mental de Sant Martí (nord) de l'Institut Català de la Salut. 2005. Document no publicat.
- Treball realitzat dins del Projecte SASPE (Senyals d'Alarma i Signes Prodròmics de l'Esquizofrènia) finançat amb l'ajuda a la investigació de la Fundació Seny (05 A/99) – AATMR (Agència d'Avaluació de les Tecnologies Mèdiques i la Recerca)


Chequeo ERiraos©


(Inventario de Detección Precoz: Early Recognition Inventory)

L'IRAOS i ERiraos van ser desenvolupats en el context de l'estudi ABC Schizophrenia Study (Häfner et al. 1995) per a l'avaluació de l'inici i curs de l'esquizofrènia.

© K. Maurer, F. Hörrmann & H. Häfner.
(Traducció al castellà de Jorge L. Tizón i Anna Oriol) EAPPP - 06/2006.

ERiraos 15.
Versió experimental.
Autors: Jorge L. Tizón, Anna Oriol y Sandra Rosenberg (EAPPP-08/2008)






Chequeo ERiraos©

(Inventario de Detección Precoz: Early Recognition Inventory)

Valora la presència/absència de símptomes inespecífics, del pròdrom tardà i de símptomes psicòtics durant els darrers 12 mesos, així com també els seus canvis d'intensitat, i la presència o absència d'alguns factors de risc.

Entrevistadors: metges, infermeres, professors, educadors, treballadors socials.....



EVALUACIÓ i RECOMANACIONS

Si només estan presents els símptomes del grup 1 – 5, probablement significa que no hi ha un risc extrem d'agudització psicòtica. No obstant això, acostuma a necessitar-se una intervenció terapèutica.



EVALUACIÓ i RECOMANACIONS

Els símptomes del grup 6 – 10 son els que indiquen un increment del risc de psicosi. En aquest cas es necessiten exploracions diagnòstiques especialitzades. L'expert en detecció i intervenció precoç decidirà l'estratègia d'intervenció primerenca més adequada.

**EVALUACIÓ i RECOMANACIONS**

Els símptomes del grup 11 – 15 son signes d'una psicosi, com a mínim incipient. Ha de realitzar-se immediatament una intervenció terapèutica.



Bibliografía:

. Häfner H, Maurer K, Löffler W et al. Onset and early course of Schizophrenia. In: Häfner H, Gattaz WF (eds). Search for the causes of Schizophrenia III. Berlín: Springer, 1995:43-66.

Maurer K, Hörrmann F, Schmidt G et al. The early recognition inventory ERlraos: a two-step procedure for detection of "at-risk mental states". *Schizophr Res suppl* 2004; 70: s76.

Häfner H, Maurer K. Detección temprana de la esquizofrenia: datos actuales y perspectivas futuras. *World Psychiatry (Ed. Esp)* 2006: 130-137

Quijada Y, Tizón JL, Artigue J, Parra B. (2010). At-risk mental state (ARMS) detection in a community service center for early attention to psychosis in Barcelona. *Early Intervention in Psychiatry* 4(3): 257–262.